


COVID-19 AZ疫苗自費接種 常見Q&A



臺大醫院 周孜容醫師 整理



旅遊醫學教育訓練中心



COVID-19 AZ疫苗介紹

COVID-19


疫苗廠牌	疫苗類型	適用年齡	接種劑量及間隔	供應時程
阿斯利康/牛津 AstraZeneca (AZ)/ Oxford	腺病毒 載體疫苗	18歲以上	2劑， 間隔至少8週 ¹	4/21起依照疾病 管制署公告符合 特定條件之民眾 可自費接種

1.目前依世界衛生組織(WHO)建議接種間隔為8至12週；依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議為至少8週以上。



腺病毒載體疫苗

利用攜帶有COVID-19棘蛋白核酸序列的腺病毒，接種後在人體細胞內製造此疫苗抗原並自人體細胞釋出，誘發人體免疫系統產生保護力對抗COVID-19病毒入侵。



為什麼要施打疫苗？

COVID-19

疫苗可模仿病毒感染誘發免疫反應，讓人在未患病時，打入細菌、病毒的整體或片段，以誘發「人造抗體」，當下次病原再入侵，體內細胞就有經驗辨識壞病毒，產生中和抗體，對病原體產生保護力。



COVID-19疫苗接種要注意哪些事項？



COVID-19疫苗**接種前**注意事項

COVID-19

接種禁忌

- 對本疫苗之任何成分有嚴重過敏反應史(如：過敏性休克)，不予接種。
- 對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應(如：過敏性休克)，不予接種。

注意事項

- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 不同廠牌不得交替接種。
- 不得與其他疫苗同時接種，並應與其他不活化疫苗間隔至少14天，與其他活性減毒疫苗間隔至少28天，如小於上述間隔，各該疫苗無需再補種。



COVID-19疫苗**接種前**注意事項

COVID-19

特殊族群

- 免疫功能低下者(含接受免疫抑制劑治療者)，疫苗免疫反應可能減弱。
- 孕婦若為高風險感染者，可經醫師評估是否接種。
- 哺乳中的婦女若為建議接種之風險對象，接種疫苗後仍可持續哺乳。

有關AstraZeneca COVID-19疫苗部分

- 由於目前科學證據尚無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管內凝固(DIC)合併血小板低下與大腦靜脈竇栓塞(CVST)之不良事件有關，接種前請與醫師討論評估相關風險後再接種。
- 服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓之危險因子，建議現階段前述對象接種前後應停藥至少28天。



COVID-19疫苗**接種後**注意事項

COVID-19

- 接種後應於接種單位或附近稍做休息，並**觀察至少30分鐘**，無恙後再離開。
- 使用**抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者**，施打後於注射部位**加壓至少2分鐘**，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
- 接種疫苗後可能出現**接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心**，通常輕微並於**數天內消失**。

應就醫之情形

- 接種後出現**發燒反應($\geq 38^{\circ}\text{C}$)超過48小時**、**接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍**、或嚴重過敏反應，如：**呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹**等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。



COVID-19疫苗**接種後**注意事項

COVID-19

有關AstraZeneca COVID-19疫苗部分

- 接種疫苗後若14天內出現**呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑**等症狀，應立即就醫。
- 依據Astra Zeneca 疫苗臨床試驗結果，接種後各項不良反應及頻率如下：

頻率	疫苗接種後不良反應
非常常見($\geq 1/10$)	接種部位疼痛、腫脹、瘀傷、疲倦；不適(malaise)；發熱/發燒；發寒；頭痛；噁心；關節痛；肌肉痛
常見($\geq 1/100$ to $< 1/10$)	嘔吐；接種部位硬塊
不常見($\geq 1/1,000$ to $< 1/100$)	淋巴結腫大；食慾降低；頭暈(Dizziness)；腹痛；多汗症；搔癢；皮疹

Ref : UK Information for Healthcare Professionals on COVID-19 Vaccine AstraZeneca



COVID-19疫苗自費接種Q&A




自費接種COVID-19疫苗開放對象為何？

- 自**110年4月21日**起提供民眾自費接種COVID-19疫苗，適用對象：**商務、出國工作、留學及就醫**等人道考量者。
- 現階段國際疫情仍屬嚴峻，全球大部分國家為第三級流行地區，民眾應避免所有非必要之出國旅遊，故暫**不開放純以旅遊為目的**之出國者自費接種COVID-19疫苗。

自費接種COVID-19疫苗，可否選擇疫苗廠牌？

自費接種疫苗皆由指揮中心統一調度，民眾**不得挑選廠牌**。




COVID-19疫苗自費接種如何預約掛號？

- 開放設有旅遊醫學門診之COVID-19疫苗接種專責醫院辦理，全台共計**31家**。
- 自費接種疫苗門診時間及診次、預約方式及收費等訊息，將由各醫院公布於醫院官網，開放有出國必要之民眾預約。
- 旅遊醫學門診合約醫院據點：<http://at.cdc.tw/5941oR>

自費接種COVID-19疫苗所需費用？

- 自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。
- 指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元。實際費用請洽詢各醫院。





COVID-19疫苗自費接種，是否需出具相關文件，以證明符合開放對象？

民眾前往旅遊醫學門診時，需於COVID-19疫苗**自費接種意願書**填列「**出國目的**」，以利醫療紀錄。此外，門診醫師看診時，亦會詢問出國目的(如工作、留學等)，無須額外出示證明或簽立切結書。

已完整自費接種COVID-19疫苗2劑者，是否可豁免或縮短居家檢疫天數？

- 目前國際疫情仍嚴峻，且疫苗涵蓋率尚不足，故**自國外入境者仍須依照指揮中心規定進行入境居家檢疫及自主健康管理**。
- 疫苗保護力並非100%，即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離。




接種疫苗後還會感染新冠病毒嗎？

- 疫苗保護力並非100%，接種疫苗後，仍有少數機會會罹患COVID-19。
- 因此即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

疫苗對新冠病毒變異毒株也有效嗎？

- 目前有限的實證顯示COVID-19疫苗可能對新的變異株有部分的保護力，但保護力隨不同疫苗或不同病毒變異株而有所差異。





接種完疫苗多久可以得到保護力？

- 疫苗注射後，身體需要時間產生保護性抗體，一般約2週後開始產生保護力。
- 取得緊急使用授權之臨床試驗資料顯示，需接種兩劑之COVID-19疫苗，**第二劑接種後7至14天**開始產生保護力。

疫苗的免疫力能維持多久？

COVID-19疫苗的臨床試驗或接種計畫迄今僅實施數個月之久，疫苗的保護力可維持多久需要有更長時間的觀察資料來回答。



COVID-19疫苗接種健康回報系統

Taiwan V-Watch

- 施打COVID-19 疫苗後，現場將提供QR code掃描加入V-Watch。
(QR code僅於接種處提供。)
- 系統將主動推播告知須回報健康狀況日期，追蹤至疫苗完整接種後一年半為止。

